

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: GCL 1.13
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	USO DE ANTICOAGULANTES ORALES	Fecha: 01/2024 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% de pacientes en tratamiento anticoagulante oral (TACO) con INR en rango terapéutico según protocolo.
FÓRMULA	$\frac{\text{Nº de pacientes en TACO con INR en rango terapéutico según protocolo}}{\text{Nº total de pacientes en TACO evaluados en el periodo}} \times 100$
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	90 %
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta de cotejo en software REDCap - Esquema dosificación anticoagulante oral Unidad de Alta Asistida - Ficha Clínica de Paciente
PERIODICIDAD	Trimestral
RESPONSABLE	<ul style="list-style-type: none"> - Médico Jefe Unidad de Alta Asistida - Enfermera de Continuidad Unidad de Alta Asistida
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN	<p>Se realiza una revisión de manera retrospectiva, considerando como Universo la totalidad de pacientes en esquema de dosificación de tratamiento anticoagulante del trimestre anterior, se verificará que el INR al alta se encuentre dentro de rango terapéutico según protocolo.</p> <p>El registro de la medición se realiza hasta el día 10 del mes siguiente al periodo evaluado.</p>
CRITERIOS EVALUADOS	<p>Los criterios evaluados según protocolo son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUT - Diagnóstico - INR al alta, dentro de rango terapéutico según protocolo
SERVICIOS O UNIDADES	Unidad de Alta Asistida.