

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: GCL 2.2 -3
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN (LPP)	Fecha: 01/2024 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% de pacientes con riesgo moderado o alto que tienen las 2 medidas de prevención de LPP aplicadas.
FÓRMULA	Nº de pacientes con riesgo moderado o alto de desarrollar LPP que tienen las dos medidas de prevención aplicadas x 100
	Nº Total de pacientes hospitalizados evaluados con riesgo moderado o alto de desarrollar LPP
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	80%
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja de Enfermería,</li> <li>- Pauta de Cotejo en software REDCap Pauta de Cotejo en software REDCap "GCL 2.2-3 Prevención de lesiones por presión (LPP) " V2.</li> <li>- Primer Listado del día de pacientes hospitalizados en el Servicio</li> </ul>
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLES	Enfermera Encargada de Calidad del Servicio.
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN	<p>Se realiza una prevalencia mensual con el total de pacientes hospitalizados en el Servicio quienes deben tener registrada la evaluación del riesgo, posteriormente se revisa a aquellos con mediano riesgo (MR) y alto riesgo (AR), quienes deben tener registradas y aplicadas dos medidas de prevención según protocolo.</p> <p>Esta medición se realiza entre las 10:00 y las 12:00 horas y en la fecha definida, según los calendarios entregados por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.</p>
CRITERIOS EVALUADOS	<p>Los criterios a evaluar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de ficha del paciente</li> <li>- Riesgo Braden-Bergstrom (Alto-Medio-Bajo) evaluado desde las 6 horas de hospitalizado.</li> </ul> <p>En el caso que no esté evaluado el riesgo, se considera que no cumple.</p> <p>En el caso que esté medido, se debe responder cuál es el riesgo (Alto-Medio-Bajo)</p> <p>En el caso de ser riesgo Medio: aplicación de las medidas generales según protocolo, cambio de posición cada 4 horas, uso de colchón antiescara.</p> <p>En el caso de ser riesgo Alto: aplicación de las medidas generales, según protocolo, cambio de posición cada 2 horas, uso de colchón viscoelástico.</p> <p>Si el paciente ya tiene LPP, indicarlo con un SI, se excluyen lesiones previas a hospitalización.</p>
SERVICIOS O UNIDADES	UCM primer piso, UCM sexto piso, UTI quinto piso, UPC Valech, UPC primer piso, UPC Quemados.