

	HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA	Código: GCL 2.2 -3
	UNIDAD DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Versión: 1
	PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN (LPP)	Fecha: 01/2025 Vigencia: 1 año

INDICADOR	% de pacientes con riesgo moderado o alto que tienen las 2 medidas de prevención de LPP aplicadas.
FÓRMULA	Nº de pacientes con riesgo moderado o alto de desarrollar LPP que tienen las dos medidas de prevención aplicadas x 100
	Nº Total de pacientes hospitalizados evaluados con riesgo moderado o alto de desarrollar LPP
ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO	80%
FUENTE DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de Enfermería, - Pauta de Cotejo en software REDCap "GCL 2.2-3 Prevención de lesiones por presión (LPP) " V4. - Primer Listado del día de pacientes hospitalizados en el Servicio
PERIODICIDAD	Mensual
RESPONSABLES	Enfermera Encargada de Calidad del Servicio.
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN	<p>Se realiza una prevalencia mensual con el total de pacientes hospitalizados en el Servicio quienes deben tener registrada la evaluación del riesgo, posteriormente se revisa a aquellos con mediano riesgo (MR) y alto riesgo (AR), quienes deben tener registradas y aplicadas dos medidas de prevención según protocolo.</p> <p>Esta medición se realiza en la fecha definida, según los calendarios entregados por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.</p>
CRITERIOS EVALUADOS	<p>Los criterios a evaluar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de ficha del paciente. - Riesgo Braden-Bergstrom (Alto-Medio-Bajo) evaluado desde las 6 horas de hospitalizado. <p>En el caso que no esté evaluado el riesgo, se considera que no cumple.</p> <p>En el caso que esté medido, se debe responder cuál es el riesgo (Alto-Medio-Bajo)</p> <p>En el caso de ser riesgo Medio: aplicación de las medidas generales según protocolo, cambios de posición o alivio de puntos de presión cada 4 horas con SEMP adecuada o de lo contrario cada 2 hrs., y uso de SEMP.</p> <p>En el caso de ser riesgo Alto: aplicación de las medidas generales, según protocolo, cambio de posición o alivio de puntos de presión cada 3 hrs., con SEMP adecuada o de lo contrario cada 2 hrs, y uso de SEMP.</p>
SERVICIOS O UNIDADES	UCM primer piso, UCM sexto piso, UTI quinto piso, UPC Valech, UPC primer piso, UPC Quemados.